

LIDT OM SPURVEPAPEGØJER (FORPUS)

Spurvepapegøje er små, overvejende grønne papegøjer fra Syd- og Mellemamerika. De har vundet mange hjerter verden over på grund af deres livlige væsen og afdæmpede stemmer. *Forpus* (ana-grammatisk) = Profus, der betyder udbredt, spredt ud (hentyder til spurvepapegøjernes hale).

Navnet spurvepapegøjer er tildelt pga. deres adfærds lighed med spurves, dvs. store livlige flokke, der gerne går på jorden og leder efter græs- og ukrudtsfrø. Slægten spurve (*passer*) har også lagt navn til den Grønryggede spurvepapegøje *F. passerinus* = ligner spurve.

I modsætning til Agapornisarterne bygger spurvepapegøjer ikke en egentlig rede. De yngler i hule træer, telefonpæle, selv manglende mursten kan være plads nok til en spurvepapegøje.

KORT OM PASNING:

Spurvepapegøjer er fordringsløse fugle, som har et behageligt væsen. Skal som et must holdes parvis, da mere end et par kan resultere i voldsomme kampe og som regel med døden til følge for det underlegne par. Ideel til kassebur med målene 70 x 50 x 50 cm (l x h x d), hvor fuglene kan holdes året rundt. Uden for ynglesæsonen kan det være en god ide at holde hanner, hunner og ungfugle i tre adskilte volierer på mindst 2 m og med adgang til et frostfrit inderrum.



Foto: Christian Nielsen

Spurvepapegøjer bygger ikke, som Agapornis-slægten, en egentlig rede, og redekassen skal derfor helst forsynes med et passende redemate-

riale (savsmuld blandet med ovntørret træflis er udmærket).

Fodringen volder ikke de store problemer, da de fleste parakitblandinger kan anbefales, men til fugle, som opholder sig på begrænset plads, må det kraftigt anbefales at undgå solsikke, hamp og lignende fedende frøsorter.

Kuld størrelsen svinger fra 4 - 7 æg, men 6 er det mest almindelige. Kuld på mere end 7 æg bør reduceres ved flytning eller fjernelse af overkydende æg. Ringmærkning sker omkring dag 10, eller når ungen åbner øjnene.



Foto: Brian Nielsen

Find flere oplysninger om spurvepapegøjer på klubbens website, www.danskagapornisklub.dk, eller i bogen "Kom godt i gang - med dværgpapegøjer og spurvepapegøjer".

Kom godt i gang
- med dværgpapegøjer og spurvepapegøjer
og ungdomskuffelser

- Artsbeskrivelse
- Opstart
- Buret
- Foder
- Opdræt
- Sygdom
- Arvelighedslære
- Frembringelse af farver
- Forening

100,-

DANSK AGAPORNIS KLUB **DANSK BOG**

om dværgpapegøjer og spurvepapegøjer,
udgivet af Dansk Agapornis Klub

Læs mere på www.danskagapornisklub.dk



DANSK AGAPORNIS

www.danskagapornisklub.dk



info om spurvepapegøjer (Forpus)



Scheelsvej 1
DK-4733 Tappernøje
Denmark

Tel.: (0045) 2250 7720
info@danskagapornisklub.dk

FORPUS FAMILIEN OMFATTER 7 ARTER MED I ALT 19 UNDERARTER

DE 7 ARTER:

Lessons spurvepapegøje

(Spurvepapegøje) (*Forpus coelestis*); En af de største arter med en klar grøn maske. Det er langt den mest almindelige spurvepapegøjeart i fugleholdet i hele Europa. Arten har et roligt temperament, er let at holde og er meget ynglevillig. Deres popularitet skyldes ikke mindst den voksende mængde mutationer. **Udbredelse:** Sydvestlige Ecuador og nordvestlige Peru. **Underarter:** Ingen.




Grønrygget spurvepapegøje

(*Forpus passerinus*); En af de mindre arter, med vekslende lysegrønne farver. Arten er relativt almindelig i Danmark. Er let at holde og yngler villigt under de rette forhold. En enkelt mutation er etableret i fugleholdet. **Udbredelse:** Forekommer i Guyana, Surinam og Fransk Guyana, de øvrige underarter desuden i landene Brasilien, Venezuela og Colombia. **Underarter:** Spengels spurvepapegøje (*F. p. spengeli*), var tidligere almindelig i Danmark. Er desværre blevet krydset med grønrygget spurvepapegøje, og der er nu meget få renavlede fugle i fugleholdet. Venezuela grønrygget spurvepapegøje (*F. p. viridissimus*), er desværre formodentlig uddød som renavlet underart i fugleholdet. Øvrige underarter, der ikke findes i fugleholdet: *F. p. cyanophanes*, *F. p. cyanochlorus* og *F. p. deliciosus*.



Brille spurvepapegøje

(*Forpus conspicillatus*); En af de mindre arter af spurvepapegøje hvor hannen har blå tegninger omkring øjet. Det er en af de almindeligst opdrættede spurvepapegøjer i Europa herunder i Danmark hvor den er relativt almindelig i fugleholdet. Den er ynglevillighed og har et roligt temperament. Enkelte mutationer er etableret i fugleholdet. **Udbredelse:** Colombia og det sydligste Panama og østligste Venezuela. **Underarter:** *F. c. metae* og *F. c. caucae*.



Blårygget spurvepapegøje

(*Forpus xanthopterygius*); En af de mindre arter af spurvepapegøjer med afdæmpede grønne og blå farver. Var tidligere mere udbredt i fugleholdet men har været næsten forsvundet fra det europæiske fuglehold, men blev opretholdt i Tyskland. I 2012 kom der enkelte par af arten til Danmark fra den tyske bestand. Arten kan ansføres til at yngle under de rette forhold, men er mere frygtsomt anlagt end flere af de andre arter. **Udbredelse:** Argentina, Paraguay og Brasilien, de øvrige underarter desuden i Ecuador og Bolivia. **Underarter:** Ceara blårygget spurvepapegøje (*F. x. flavissimus*), var tidligere mere udbredt i det europæiske fuglehold men er nu meget sjælden og tæt på at uddø i fugleholdet. Øvrige underarter, der ikke findes i fugleholdet: *F. x. crassirostris* og *F. c. flavescens*.




Mexicansk spurvepapegøje

(*Forpus cyanopygius*); En af de største arter og den eneste spurvepapegøje hvor hannen kun har lyseblå, og ingen mørkeblå, farver. Arten er sjælden i hele Europa, men der er en lille bestand der opretholdes løbende af få opdrættere. En enkelt dansk opdrætter har, gennem en længere årrække, stået for en stor andel af det samlede europæiske opdræt. Arten er svær at få til at yngle, og mange opgiver inden de opnår opdræt. Ofte yngler fuglene først når de er flere år gamle. Fuglene forholder og bevæger sig ofte roligt, men det kan dække over et nervøst gemyt. **Udbredelse:** Mexico. **Underarter:** *F. c. insularis*, der ikke findes i fugleholdet.



Gulmasket spurvepapegøje

(*Forpus xanthops*); Den største af spurvepapegøjeartene med en klar gul maske. Arten har en sund bestand i fugleholdet og er blevet ret almindelig i Danmark. Arten har et roligt temperament og er blevet mindre vanskelig og kan ofte ansføres til at yngle under de rette forhold, dog oftest først fra de er ca. 2 år. **Udbredelse:** Marañón-floddalen i det nordvestlige Peru. **Underarter:** Ingen.



Sortnæbbet spurvepapegøje

(*Forpus modestus*); Findes ikke under beskyttede forhold, og det er usandsynligt, at den kommer i hænderne på fugleholdere. **Udbredelse:** Forekommer i Peru, Brasilien, Ecuador og Colombia. **Underarter:** *F. m. sclateri*.